

Atención preventiva - Infantil

¿Sabe con qué frecuencia debe hacerse una prueba médica o acudir al médico?
 ¿Sabe qué pruebas y servicios se consideran preventivos?



¿Qué son los servicios de atención preventiva?

Es importante visitar regularmente al médico de atención primaria (PCP) o al pediatra para recibir atención preventiva. La atención preventiva permite a su PCP detectar posibles problemas de salud antes de que se sienta enfermo. Al detectar los problemas médicos a tiempo, su PCP puede ayudarle a obtener la atención que necesita para mantenerse sano.



¿Cuándo son gratuitos los servicios?

El mismo servicio puede ser preventivo (gratuito) o diagnóstico (se aplican copagos, coseguros o deducibles).

La atención preventiva es gratuita (sin costo para el afiliado) cuando es:

- Enumerada en esta guía que se encuentra en osuhealthplan.com/forms-and-downloads
- Completada por un proveedor de la red o una farmacia preferida. Visite osuhealthplan.com y utilice nuestra herramienta de búsqueda de proveedores para encontrar médicos de la red
- Realizada con fines preventivos



CUIDADO	MOTIVO DEL SERVICIO	LO QUE PAGARÁ
Cuidado preventivo	Para prevenir problemas de salud. No tiene síntomas.	No pagará nada. <i>gratuito</i>
Cuidado diagnóstico	Presenta un síntoma o se somete a una revisión debido a un problema de salud conocido.	Se trata de una reclamación médica. Pueden aplicarse el deducible, los copagos y el coseguro. Recuerde que la visita al consultorio de su médico de atención primaria es gratuita si su proveedor forma parte de la red principal. Si le hacen análisis de sangre o radiografías, tendrá que pagar la totalidad o parte de los gastos.



Atención preventiva infantil

EDAD	RECOMENDACIÓN	COSTO
Recién nacido	Una visita 3 - 5 días después del alta	Gratuito
0 a 2 años	Una visita a los 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses	Gratuito
3 a 6 años	Una visita a los 30 meses y una visita al año entre los 3 y los 6 años	Gratuito
7 a 10 años	Una visita cada 1 - 2 años	Gratuito
11 a 18 años	Una visita al año	Gratuito

VACUNA	RECOMENDACIÓN	COSTO
Varicela	Una dosis entre los 12 y los 15 meses de edad. Segunda dosis entre los 4 y los 6 años. Para niños a partir de 13 años sin antecedentes de vacunación o enfermedad, dos dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas.	Gratuito
COVID-19	Para consultar las recomendaciones actuales de los CDC sobre la vacunación contra COVID-19, visite cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines .	Gratuito
Difteria, tétanos, tos ferina (pertussis)	Una dosis de DTPa a los 2, 4, 6, 18 meses y 4-6 años (5 dosis). Una dosis de Tdap entre los 11 y los 12 años con un refuerzo de Td cada 10 años después. Los mayores de 7 años no vacunados previamente pueden recibir una dosis única de Tdap.	Gratuito
Gripe (influenza)	Dos dosis con un intervalo de 4 semanas para niños sanos de entre 6 meses y 8 años la primera vez que se vacunan. Los niños que se hayan vacunado previamente contra la gripe pueden recibir una dosis al año.	Gratuito
Haemophilus influenza tipo b	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses y una vez entre los 12 y 18 meses de edad.	Gratuito
Hepatitis A	Dos dosis con un intervalo mínimo de 6 meses entre los 12 y los 23 meses de edad. Para los niños no vacunados previamente, se pueden administrar dos dosis con un intervalo mínimo de 6 meses a discreción del médico.	Gratuito
Hepatitis B	Una dosis a todos los recién nacidos antes de salir del hospital, una segunda dosis entre 1 - 2 meses y una tercera dosis entre 6 - 18 meses. Puede empezar entre 2 - 18 años si no se vacunó de bebé.	Gratuito
VPH (virus del papiloma humano)	De 2 a 3 dosis en un período de 24 semanas a partir de los 11 años de edad para niños y niñas. Su médico puede administrar la vacuna a partir de los 9 años si su hijo presenta un riesgo elevado.	Gratuito
Poliomielitis	Una dosis a los 2 y 4 meses y entre los 16 y 18 meses (3 dosis en total). Después, una dosis entre los 4 y los 6 años.	Gratuito
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)	Una dosis entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 4 y los 6 años. Puede administrarse a niños mayores si no hay antecedentes de vacunación o de la enfermedad.	Gratuito
Meningitis (antimeningocócica)	Una dosis entre los 11 y los 12 años, y otra a los 16 años. Si la primera dosis se administra entre los 13 y los 15 años, la segunda dosis debe administrarse entre los 16 y los 18 años. Los médicos pueden administrar la vacuna a partir de los 2 años si su hijo presenta un riesgo elevado.	Gratuito
Neumonía (antineumocócica)	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses y otra a los 12-15 meses. Los niños mayores de 2 años pueden recibir una dosis única si no han sido vacunados previamente. Los niños con una enfermedad subyacente pueden recibir una dosis adicional. Los niños de alto riesgo pueden ser vacunados después de los 7 años.	Gratuito
Rotavirus	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.	Gratuito

VACUNAS