

Atención preventiva - Infantil

¿Sabe con qué frecuencia debe hacerse una prueba médica o acudir al médico?
 ¿Sabe qué pruebas y servicios se consideran preventivos?



¿Qué son los servicios de atención preventiva?

Es importante visitar regularmente al médico de atención primaria (PCP) o al pediatra para recibir atención preventiva. La atención preventiva permite a su PCP detectar posibles problemas de salud antes de que se sienta enfermo. Al detectar los problemas médicos a tiempo, su PCP puede ayudarle a obtener la atención que necesita para mantenerse sano.



¿Cuándo son gratuitos los servicios?

El mismo servicio puede ser preventivo (gratuito) o diagnóstico (se aplican copagos, coseguros o deducibles).

La atención preventiva es gratuita (sin costo para el afiliado) cuando es:

- Enumerada en esta guía que se encuentra en osuhealthplan.com/forms-and-downloads
- Completada por un proveedor de la red o una farmacia preferida. Visite osuhealthplan.com y utilice nuestra herramienta de búsqueda de proveedores para encontrar médicos de la red
- Realizada con fines preventivos



CUIDADO	MOTIVO DEL SERVICIO	LO QUE PAGARÁ
Cuidado preventivo	Para prevenir problemas de salud. No tiene síntomas.	No pagará nada. <i>gratuito</i>
Cuidado diagnóstico	Presenta un síntoma o se somete a una revisión debido a un problema de salud conocido.	Se trata de una reclamación médica. Pueden aplicarse el deducible, los copagos y el coseguro. Recuerde que la visita al consultorio de su médico de atención primaria es gratuita si su proveedor forma parte de la red principal. Si le hacen análisis de sangre o radiografías, tendrá que pagar la totalidad o parte de los gastos.



Atención preventiva infantil

EDAD	RECOMENDACIÓN	COSTO
Recién nacido	Una visita 3 - 5 días después del alta	Gratuito
0 a 2 años	Una visita a los 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses	Gratuito
3 a 6 años	Una visita a los 30 meses y una visita al año entre los 3 y los 6 años	Gratuito
7 a 10 años	Una visita cada 1 - 2 años	Gratuito
11 a 18 años	Una visita al año	Gratuito

VACUNA	RECOMENDACIÓN	COSTO
Varicela	Una dosis entre los 12 y los 15 meses de edad. Segunda dosis entre los 4 y los 6 años. Para niños a partir de 13 años sin antecedentes de vacunación o enfermedad, dos dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas.	Gratuito
COVID-19	Para consultar las recomendaciones actuales de los CDC sobre la vacunación contra COVID-19, visite cdc.gov/covid/vaccines .	Gratuito
Difteria, tétanos, tos ferina (pertussis)	Una dosis de DTPa a los 2, 4, 6, 18 meses y 4-6 años (5 dosis). Una dosis de Tdap entre los 11 y los 12 años con un refuerzo de Td cada 10 años después.	Gratuito
Gripe (influenza)	Dos dosis con 4 semanas de diferencia para niños sanos de entre 6 meses y 8 años la primera vez que reciben la vacuna. Los niños que ya se han vacunado contra la gripe pueden recibir una dosis anual.	Gratuito
Haemophilus influenza tipo b	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses y una vez entre los 12 y 18 meses de edad.	Gratuito
Hepatitis A	Dos dosis con un intervalo mínimo de 6 meses entre los 12 y los 23 meses de edad. Para los niños no vacunados previamente, se pueden administrar dos dosis con un intervalo mínimo de 6 meses a discreción del médico.	Gratuito
Hepatitis B	Una dosis a todos los recién nacidos antes de salir del hospital, una segunda dosis entre los 1 y 2 meses y una tercera dosis entre los 6 y 18 meses. Puede comenzar entre los 2 y los 18 años si no se vacunó de bebé.	Gratuito
VPH (virus del papiloma humano)	De 2 a 3 dosis en un período de 24 semanas a partir de los 11 años de edad para niños y niñas. Su médico puede administrar la vacuna a partir de los 9 años si su hijo presenta un riesgo elevado.	Gratuito
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)	Una dosis entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 4 y los 6 años. Puede administrarse a niños mayores si no hay antecedentes de vacunación o de la enfermedad.	Gratuito
Meningitis (antimeningocócica)	Una dosis entre los 11 y los 12 años, y otra a los 16 años. Los adolescentes y adultos jóvenes (de 16 a 23 años) también pueden recibir la vacuna contra la meningitis por meningitis tipo B. Los médicos pueden administrar la vacuna a partir de los 2 años si su hijo presenta un alto riesgo.	Gratuito
Neumonía (antineumocócica)	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses y otra a los 12-15 meses. Se puede administrar a niños mayores con alto riesgo.	Gratuito
Poliomielitis	Una dosis a los 2 y 4 meses y entre los 16 y 18 meses (3 dosis en total). Después, una dosis entre los 4 y los 6 años.	Gratuito
Rotavirus	Una dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.	Gratuito

VACUNAS